


ЎСИМЛИКЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ДУНЁСИ

AVH AgroVetHimoya



Bayer AG

FMC



NIHON NOHYAKU CO., LTD.

avgust crop protection



KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD



SUMMIT AGRO INTERNATIONAL LTD.

Агроветхимоя МЧЖ 2004 йилда ташкил топган бўлиб, асосий мақсади-сифатли кимёвий воситалар, минерал ўғитлар, томчилаб суғориш тизимини тўлдирувчи эхтиёт қисмлар ва сифатли уруғлар билан қишлоқ хужалиги маҳсулоти ишлаб чиқарувчиларни таъминлаб беришни кузда тутган. Корхона малакали мутахассислар иштирокида: кластер, фермер, боғдорчилик, хусусий ва иссиқхона хужалиklarини экин ҳимояси ва озиклантириш бўйича маслаҳатлар беришни ҳам йулга қўйган. Шу қаторда қишлоқ хўжалигига зарар етказётган ҳашоратлар билан муаммоларни ҳал қилиш, хосилдорликни ошириш, илмий изланиш ва ишлаб чиқаришга зарур бўлган янги хориж технологияларини мутахассисларга етказишга ҳаракат қилипти. Агроветхимоя корхонаси ҳашоратларга қарши курашиш ва озиклантириш воситалари ишлаб чиқариш бўйича дунёни энг илғор БАЙЕР, ФМС, АВГУСТ ва бошқа бир қатор корхоналари билан ўзликсиз алоқада бўлиб ўз ҳимоя воситаларини янгилаш устида изланишлар олиб борапти. Шунингдек корхона мутахассислари қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларга ҳимоя ва озиклантириш дастури тузишга ва уни тўғри қўллашга ёрдам беришни ҳам йулга қўйган. Бизнинг корхона “Сизнинг даромадингиз ўз қўлингизда” деган шиорга амал қилишга ҳаракат қилипти.

web: www.avh.uz

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР 3...28

ФУНГИЦИДЛАР 29...45

УРУҒЛАРНИ ЭКИШДАН ОЛДИН ДОРИЛАШДА ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ПРЕПАРАТЛАР 46...51

ГЕРБИЦИДЛАР 52...63

ДЕФОЛИАНТ 64...65

ЎСИМЛИКЛАРНИ ЎСИШНИ БОШҚАРУВЧИ ПРЕПАРАТЛАР 66...69

МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР 70...77

МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР 78...78

ТОМЧИЛАБ СУҒОРИШ ТИЗИМИ 79...82

УРУҒЛАР 83...86

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

АВАНТ 15% ЭМ.К.

Ишлаб чиқарувчи: FMC (АҚШ)

Таъсир этувчи моддаси: Индоксакарб 150 г/л

Препарат шакли: Эмульсия концентрат

Янги оксидиазин синфига қарашли контакт-тартибли инсектицид.

Ҳақиқий овицид, ҳамма ёшдаги личинкаларга қарши юқори самарага эга.



Қадоғи: 1л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Ѓўза	Ѓўза тунлами	0,4-0,45	300	15 (3)
Тут	Тут парвонаси	0,3	1000	3 (1)
Ток	Шингил барғурар	0,25		3 (1)
Иссиҳонадаги ва очиқ даладаги помидор	Ѓўза тунлами	0,4		4 (1)
Олма	Олма мавахўри	0,35	300	4 (1)
Масҳар	Маврак тунлами	0,3-0,4		10-15 (3)

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

АЛТАКОР 35 % С.Э.Г.

Ишлаб чиқарувчи: ФМС (АҚШ)

Таъсир этувчи моддаси: Хлорантранилипрол

Препарат шакли: Сувда эрувчи гранулалар

Самараси бўйича олий табақали инсектицид!

Алтакор ғўза, олма, шафтоли, картошка, помидор ва бошқа экинларни зараркундалар мажмуасидан ҳимоя қилишга мўлжалланган бўлиб, ноёб таъсир механизми мавжудлиги туфайли ҳатто пестицидларга сезгир бўлмаган зараркундаларни ҳам назорат қилади. Тангачақанотлилар (тунламлар, мевахўрлар, қуялар, баргўрар қўртлар) ва қаттиққанотлилар (колорадо қўнғизи) гуруҳларига мансуб бўлган зараркундаларнинг кенг кўламига қарши юқори самарадорлиги билан ажралиб туради.



Қадоғи: 50гр

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Иссиқхонадаги помидорда	ғўза тунлами	0,1-0,12	300	3-4 (3)
	помидор ғовакловчи қуяси		1000	1(1)

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

АППЛАУД 25% н. кук.

Ишлаб чиқарувчи: Нихон Нохиакү (Япония)

Таъсир этувчи моддаси: Бупрофезин

Препарат шакли: Намланувчи кукун

Қишлоқ хўжалик экинларида оққанотлар, қалқондорлар ва бошқа зарар кунандаларга қарши ишлатиладиган янги авлод инсектициди



Қадоғи: 0,5кг

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Вўза	Оққанот	0,5-1,0	300	17 - 35 (3)
Иссиқхонадаги бодринг ва помидор		0,5	1 000	5 (1)

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

БЕНЕВИЯ м.сус.к

Ишлаб чиқарувчи: FMC (АҚШ)

Таъсир этувчи моддаси: Циантранилипрол

Препарат шакли: Мойли суспензия концентрати

Юқори ҳосил учун аъло ҳимоя!

Кемирувчи ва сўрувчи зараркундаларнинг кенг қўламидан аъло даражада ҳимояловчи инновацион инсектицид, биологик агентларнинг стрессини камайтиради, экиннинг ҳосил тўплаш потенциални максимумгача кўтаради ва энг сифатли ҳосил етиштиришни таъминлайди. Ўсув даври бошларида қўлланган препарат нозик, нафис ниҳолларни шикастланишдан асрайди ва экинда вирус касалликлари тарқалишининг олдини олади.



Қадоғи: 1л.

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Иссиқхонадаги помидорда	тангачақанотли ва баргхўр қуртлар ҳамда ғовакловчи ҳашаротларга қарши ўсув даврида пуркалади	0,50	1000	5 (1)
	Оққанотлар, тамаки трипси ва шираларга	0,75 – 1,0		7-10 (1)

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

БРЭЙК МЭ 100 г/л

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО Фирма "Август" Россия

Таъсир этувчи моддаси: Лямбда-цигалотрин

Препарат шакли: Эмульсия концентрати

Яшиндай тез таъсирли, пиретроид таркибли пестицид!

Ғалла, техник, дуккакли, сабзавот экинлари ва мевали дарахтларни баргхўр ва сўрувчи зараркунандалар, жумладан каналардан ҳимояловчи, уч хил (контакт, ичак-ошқозон орқали ва қолдиқ) таъсирли пиретроид инсектицид; яққол кўринадиган репеллент (хуркитувчи) таъсирга эга бўлиб, бунинг натижасида давомли самара кўрсатади ҳамда зараркунандаларни ҳар қандай ривожланиш босқичида тез ўлдиради.



Қадоғи: 1л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Ғўза	Ғўза тунлами, ширалар, карадина, ўргимчаккана	0,25	300	10 (3)
Буғдой	Дон қўнғизлари, трипслар, саратонлар, бургалар	0,1		3-4 (3)
	Хасва, ширалар, шиллиқ, курт	0,07	3 (3)	
Олма	Мевахўрлар, баргўрар куртлар, каналар	0,2-0,4	1000	2-4 (1)
Яйлов	Чигиртка-симонлар	0,12	300	4 (3)

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

БОРЕЙ НЕО

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО Фирма "Август" Россия

Таъсир этувчи моддаси: Альфа-циперметрин, 125 г/л
+ имидаклоприд, 100 г/л
+ клотианидин, 50 г/л

Препарат шакли: Суспензия концентрати

Зараркунандаларга уч томонлама зарба!

Таъсир механизмлари ва физик хоссалари фарқланувчи иккита кимёвий синфга мансуб бўлган, экинларнинг кенг кўламида зараркунандаларнинг кўп турларини ишончли назорат қиладиган ноёб, уч компонентли инсектицид. Ҳароратнинг кенг диапазонида зараркунандаларга жуда тез таъсир қилади ва экинларни давомли ҳимоялайди.



Қадоғи: 1л.

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Бугдой	Ширалар, шилимшиқ, қурт, трипс, дон пашшалари, хасва, дон бургалари, дон қўнғизлари	0,1-0,2	300	3-7 (3)
Картошка	Колорадо қўнғизи	0,1-0,15		3-5 (3)

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

ДАНАДИМ ЭКСПЕРТ 40% ЭМ. К.

Ишлаб чиқарувчи: FMC (АҚШ)

Таъсир этувчи моддаси: Диметоат

Препарат шакли: Эмульсия концентрати

Вуза, ғалла ва бошқа қишлоқ хўжалик экинларининг турли хил зараркунандаларига қарши ишлатиладиган тизимли таъсир қилувчи инсектоакарицид



Қадоғи: 5л.

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Вуза	Каналар, ширалар, оққанот, трипслар	1,5-2,5	300	50-80 (3)
Буғдой	Хасва, трипслар, ширалар, ғалла пашшалари, шиллиқ курт	1,5		50 (3)
Дуккакли дон экинлар	Парвоналар, ширалар, нўхат мевахўри	0,5-1,0		15 - 30 (3)
Олма, нок	Ширалар, каналар, мевахўрлар, баргхўр ва баргўрар куртлар, ширинчалар, қўнғизлар, куялар, қалқондорлар, сохта қалқондорлар	0,8-2,0	1 000	8 - 20 (1)
Олхўри	Каналар, ширалар, арракашлар	1,2-2,0		12 - 30 (1)
Ток	Каналар, унсимон куртлар, баргўрар куртлар	1,2-3,0		
Цитрус экинлари	Оққанот, каналар, унсимон куртлар, сохта қалқондорлар	3,0	300	17-35 (3)
Қанд лавлаги, хашаки	Қандалалар, бургачалар, ғовакловчи пашша, ғовакловчи куя, барг шираси, саратонлар, каналар, ўлаксахўрлар	0,5-1,0		50-70 (3)
Уруғлик картошка	Картошка куяси	1,5 - 2,0		

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

ДЕЦИС 2,5% ЭМ.К.

Ишлаб чиқарувчи: Байер АГ (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: Дельтаметрин

Препарат шакли: Эмульсия концентрати

Қишлоқ хўжалик экинларининг турли хил зараркунандаларига қарши ишлатиладиган синтетик пиретроидлар синфига мансуб кенг қамровли контакт ва ичдан таъсир қилувчи инсектицид



Қадоғи: 250 мл.

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Ўза	Ўза тунлами, оққанот, илдизқирқар тунламлар	0,7	300	25 (3)
Помидор	Илдизқирқар тунламлар, гуза тунлами, ширалар, оққанот	0,25-0,5	1 000	2,5 - 5 (1)
Олма	Мевахўрлар, баргўрар қуртлар, ширалар	0,5 - 1,0		5 - 10 (1)
Ток	Бинафша ранг, қалқондор	0,5		5 (1)
	Баргўрар қуртлар	0,4 - 0,6		4 - 6 (1)
Яйлов	Чигирткасимонлар	0,3 - 0,5	300	10 - 15 (3)
Тут	Тут парвонаси	0,4	1 000	4 (1)
Маккажўхори	Ўза тунлами	0,7	300	25 (3)
Кунгабоқар	Ўтлоқ парвонаси	0,25		8 (3)
Тамаки	Ширалар	0,5		16 (3)
Нок	Нок ширинчаси	0,6	1 000	6 (1)
Шафтоли	Шарқ мевахўри	0,5		5 (1)
Картошка	Колорадо қўнғизи	0,1 - 0,15	300	3 - 5 (3)
Тарвуз қовун	Илдизқирқар тунламлар	0,25 - 0,5		10 - 17 (3)

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

ДЕЦИС 10% ЭМ.К.

Ишлаб чиқарувчи: Байер АГ (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: Дельтаметрин

Препарат шакли: Эмульсия концентрати

Синтетик пиретроидларга мансуб кенг қўламли ошқозон-ичак орқали таъсир этувчи препарат. Кўп турдаги зарарли ҳашоротларга қарши тез таъсир этувчи универсал контактли препарат



Қадоғи: 5л.

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Помидор	Ширалар, оққанот, трипслар, илдиққирқар тунлама лар	0,1	1 000	1 (1)
Ток	Шингил баргўрари	0,05 - 0,1		
Вўза	Ширалар, трипс, оққанот, ғўза тунлами	0,2	300	7 (3)
Бўғдой	Ширалар, хасва, шиллик қурт, трипслар	0,06 - 0,08		
Бўғдой	Ғалла пашшалари, визилдоқ, қўнғиз, бургалар, саратонлар, кравчик (хумкалла қ ўнғиз)	0,08		
Олма	Олма мевахўри, қалқондорлар	0,1 - 0,15	1 000	1 - 2 (1)
Тут	Тут парвонаси	0,1		
Яйлов	Чигиртакасимонлар	0,08- 0,1	300	2 - 3 (3)

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

КАЛИПСО 48% сус.к.

Ишлаб чиқарувчи: Байер АГ (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: Тиаклоприд

Препарат шакли: Суспензия концентрати

Сўрувчи ва кемирувчи ҳашаротларга қарши тизимли ва ичдан таъсир қилувчи инсектицид



Қадоғи: 0,4л.

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Вўза	Ширалар	0,05 - 0,07	300	2 - 3 (3)
	Оққанот	0,1		
Тут	Тут парвонаси		0,1 - 0,15	1 000
Олма	Олма мевахўри, баргўрар қуртлар	0,05 - 0,1		
Ток	Шингил баргўрари		0,1 - 0,15	0,5 - 1 (3)
Помидор	Ширалар, трипслар	0,15		1 - 1,5 (3)
	Оққанот		1,5 (1)	

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

КОРАГЕН 20% С.К.

Ишлаб чиқарувчи: FMC (АҚШ)

Таъсир этувчи моддаси: 200 г/л хлорантранилипрола

Препарат шакли: Суспензия концентрати

Тўсиқларсиз ҳимоя!

Инновацион, қишлоқ хўжалик экинларини зараркундалардан ҳимоя қилиш ҳақидаги анъанавий тасавурларда тўнтариш ясаган, энг янги таъсир механизмига эга бўлган инсектицид!

Тангачақанотлилар (тунламлар, мевахўр қуртлар, куялар, баргўрар қуртлар) ва қаттиққанотлилар (колорадо қўнғизи) отрядларига мансуб бўлган зараркундаларнинг кенг кўламига қарши юқори самараси билан ажралиб туради, ғўза, сабзавотлар ва мевали дарахтларни ҳимоя қилишда кенг қўлланилади. *Кораген* ҳар хил об-ҳаво шароитларида ҳимоя муддати узоқлиги ва барқарорлиги билан ҳам ажралиб туради.



Қадоғи: 50мл

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Картошка	колорадо қўнғизи	0,04-0,05	300	1,5-2(3)
Ғўза	ғўза тунлами	0,15-0,2		5-7(3)
Иссиқхонадаги помидор		0,1-0,15	1000	1-2(1)

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

КОНФИДОР 20% с.э.к.

Ишлаб чиқарувчи: Байер АГ (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: Имидаклоприд

Препарат шакли: Эмульсия концентрати

Сўрувчи ва кемирувчи зараркунандаларга қарши неоникотиноидлар синфига мансуб тизимли инсектицид



Қадоғи: 1л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Ғўза	Ширалар	0,1-0,15	300	3 - 5 (3)
	Трипслар	0,15-0,2		5 - 7 (3)
Ғўза, помидор	Оққанот	0,3-0,4		10 - 13 (3)
Картошка	Колорадо қўнғизи	0,05		2 (3)
Тамаки	Ширалар	0,1-0,2		3 - 7 (3)
Яйлов	Чигирткасимонлар	0,05-0,1		2-3 (3)
Қанд лавлаги	Лавлаги узунбуруни	0,15-0,25		5-8 (3)
Олма	Бинафшаранг қалқондор	0,15-0,25	1 000	1,5 - 2,5 (1)

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

КОНФИДОР ЭКСТРА 70% с.э.г.

Ишлаб чиқарувчи: Байер АГ (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: Имидаклоприд

Препарат шакли: Сувда эрувчан гранулалар

Неоникотиноидлар синфига мансуб сўрувчи ва кемирувчиларга

ошқозон-ичак орқали таъсир этувчи контактли инсектицид



Қадоғи: 0,5кг

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Помидор	Ширалар, оққанот, трипслар	0,03	1 000	0,3 (1)
Бодринг				

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

МАРШАЛ 25% ЭМ.К.

Ишлаб чиқарувчи: FMC (АҚШ)

Таъсир этувчи моддаси: Карбосульфан

Препарат шакли: Эмульсия концентрати

Оққанот, ширалар, трипслар, ўргимчакканалар ва нематодаларга қарши янги авлод препарати



Қадоғи: 5л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Қанд лавлаги	Лавлаги узунбуруни	1,0-1,5	300	30-50 (3)

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

МОВЕНТО ЭНЕРЖИ 24% К.С.

Ишлаб чиқарувчи: Байер АГ (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: Имидаклоприд , 120 гр / л + Спиротетрамат, 120 г / л

Препарат шакли: Суспензия концентрати

Бошқа яширинмачоқ ўйнаш йўқ!

Такибида иккита таъсир этувчи бирикмалар мавжудлиги Мовенто Энерджи препаратига ўсимлик тўқимасида системали тарқалишнинг иккита (суюқликнинг тепага ҳамда пастга қараб йўналган оқимлари билан) ноёб усулини тақдим қилади, натижада препарат ҳашаротларнинг бориш қийин бўлган аъзоларига ҳам сингиб кириб, ҳар хил қишлоқ хўжалик экинларида сўрувчи ва кемирувчи зараркундаларнинг чидамли популяцияларини ҳам давомли (30 кунгача) назорат қилади; айти пайтда препарат озиқ-овқат хавфсизлиги талабларига ҳам тўла мос келади.



Қадоғи: 1л.

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Картошка	колорадо кўнғизига қарши	0,4-0,5	300	10-15 (3)
Олма	шира ва қалқондорларга қарши	0,4-0,6	1000	4-6 (1)
Пиёз (кўкпиёздан ташқари)	трипсларга қарши		300	10-20 (3)
Иссиқхонадаги помидорда	иссиқхона оққаноти, трипслар, шираларга қарши ишлатилади	0,4-1,5	1000	5-15 (1)

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

МОСПИЛАН 20% н.кук.

Ишлаб чиқарувчи: Ниппон Сода (Япония)

Таъсир этувчи моддаси: Ацетамиприд

Препарат шакли: Намланувчи кукун

Янги неоникотиноидлар синфига кирувчи ичак-контактли ва тизимли инсектицид



Қадоғи: 0,1кг

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Ўза	Ўза тунлами	0,3	300	10 (3)
	Ширалар, оққанот, трипслар	0,15		5 (3)
Иссиқхонадаги бодринг	Оққанот, ширалар	0,25 - 0,3	1 000	2,5 - 3 (1)
Картошка	Колорадо қўнғизи	0,02 - 0,025	300	1 (3)
Қанд лавлаги	Оддий лавлаги узунбуруни, бургалар	0,15 - 0,2		5 - 7 (3)
Яйлов	Чигирткасимонлар	0,04 - 0,045		1 - 1,5 (3)
Тут	Тут парвонаси	0,15	1 000	1,5 (1)

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

НИССОРАН 10% н.кук.

Ишлаб чиқарувчи: Ниппон Сода (Япония)

Таъсир этувчи моддаси: Гекситазокс

Препарат шакли: Намланувчи кукун

Каналарнинг тухум, личинка ва нимфаларига таъсир этувчи
замонавий ичак-контакт акарицид



Қадоғи: 1кг

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Вза	Вргимчаккана	0,1	300	3 (3)
Олма	Каналар	0,3	1 000	3 (1)

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

ОРТУС 5% сус.к.

Ишлаб чиқарувчи: Нихон Ноһиаку (Япония)

Таъсир этувчи моддаси: Фенпироксимат

Препарат шакли: Суспензия концентрати

Каналарнинг ривожланиш босқичларида ингибитор синтезини тўхтатувчи ва фалаж қилувчи контакт таъсир этувчи акарицид



Қадоғи: 0,5л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Вўза	Ўргимчаккана	0,75	300	25 (3)

НИССОРАН 10% н.кук. ва ОРТУС 5% сус.к.



КАНАЛАРДАН ҶИМОЯ КИЛИШНИНГ МУКАММАЛ ТИЗИМИ.

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

СЭМПАЙ 5% ЕС

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО Фирма "Август" Россия

Таъсир этувчи моддаси: Эсфенвалерат, 50 г/л

Препарат шакли: Эмульсия концентрати

Сэмпай тезкор нокдаун таъсир қилиш қувватига эга бўлган энг муваффақиятли синтетик пиретроиддир. Сэмпай ҳуркитувчи таъсири пиретроидлар орасида энг кучлиси бўлиб, ҳимоя қилинган ўсимликларга зарар етказилишининг олдини олишга имкон беради.

Сэмпай амалда қишлоқ хўжалиги экинларига зарар етказадиган ҳашаротларнинг барча отрядларига мансуб бўлган жуда кенг қўламини назорат қилади. Айниқса Сэмпай контакт инсектицидлар ёрдамида курашиш қийин бўлган сўрувчи ҳашаротлар – шираларга қарши юқори самара беришини алоҳида таъкидлаш керак.



Қадоғи: 5 л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Ѓўза	Шира, трипслар, оққанот, ғўза тунлами	0,5-0,6	300	15-20 (3)
Олма	Олма мевахўрлар, баргўрар	0,5 - 1	1000	5-10 (1)

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

ТАЙРА 480 г/л ЭМ.К.

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО Фирма "Август" Россия

Таъсир этувчи моддаси: Хлорпирифос, 480 г/л

Препарат шакли: Эмульсия концентрати

Тайра тез таъсирли фосфорорганик инсектицид бўлиб, экинларни кемирувчи ва сўрувчи зараркундаларнинг кенг кўламадан (жумладан, ғовакловчи ҳашаротлардан ҳам) узоқ муддат давомида ҳимоя қилади. Тайра жуда тез таъсир қилувчи, контакт, ичдан ва фумигант таъсирли инсектицид бўлиб, зараркундаларни уларнинг бутун яшаш даври давомида – тухумлик босқичидан етук зот босқичига қадар – назорат қилади. Тайра нинг яққол кўринувчи фумигантлик фаоллиги яширин ҳаёт кечирадиган зараркундаларни ҳам ўлдиришга имкон беради. Тайра нинг самараси ҳар хил ҳаво ҳароратларида – баҳорда салқин пайтида ҳам, ёз жазирамасида ҳам юқори бўлиб, ишлов пайтида ўсимликларга тушиши билан, зараркундаларга бир неча минут орасида таъсир қила бошлайди ва таъсири узоқ вақт давом этади.



Қадоғи: 10 кг

Экин тури	Қайси зараркундага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Ѓўза	Қора шира, ғўза тунлами, оққанот	1,5	300	50 (3)
Олма	Олма мевахўрлар, шира	1,5-2	1000	15-20 (1)
	Ўргинчак кана	2		

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

ТАКУМИ 20% с.э.г.

Ишлаб чиқарувчи: Нихон Нохиакү Ко., Лтд (Япония)

Таъсир этувчи моддаси: Флүбендиамид

Препарат шакли: Сувда эрувчи гранулалар

Тута абсолюта ҳашорати ва қуртларга қарши японча курашиш



Қадоғи: 0,25кг

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Дўза	Дўза тунлами	0,25	300	8 (3)
Помидор	Помидор ғовакловчи куяси	0,3	1000	3 (1)

**ТАКУМИ 20% с.э.г.
КОРАГЕН 20% с.к.**

**АЛТАКОР 35 % с.э.г.
АВАНТ 15% э.м.к.**



ТУНЛАМЛАРДАН ЭКИННИ ТЎЛИҚ ҲИМОЯСИ!

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

ТАЛСТАР 10% ЭМ.К.

Ишлаб чиқарувчи: FMC (АҚШ)

Таъсир этувчи моддаси: Бифентрин

Препарат шакли: Эмульсия концентрати

Очиқ далалар ва иссиқхоналарга катта зиён етказувчи

зараркундаларга қарши кенг қўламли инсектоакарицид



Қадоғи: 5л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Вўза	Оққанот, ғўза тунлами, ўргимчакканалар, карадрина	0,6	300	20 (3)
	Ширалар	0,3		10 (3)
	Трипслар	0,3 - 0,45		10 - 15 (3)
Олма	Олма мевахўри, баргўрар қуртлар, каналар	0,4 - 0,6	1 000	4 - 6 (1)
Помидор	Оққанот	0,6		6 (1)
	Занг кана	0,4	4 (1)	
Тут	Тут парвонаси	0,5	300	17 (3)

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

ФУФАНОН 57% ЭМ.К.

Ишлаб чиқарувчи: FMC (АҚШ)

Таъсир этувчи моддаси: Малатион

Препарат шакли: Эмульсия концентрати

Қишлоқ, хўжалик экинларда турли ҳил кемирувчи ва сўрувчи зараркунандаларга қарши ишлатиладиган, сиртдан таъсир қилувчи юқори самарали инсектицид



Қадоғи: 5л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Бўғдой	Ширалар, шиллиқ курт	1,2	300	40 (3)
	Трипслар, хасва	1,5 - 2,0		50 - 60 (3)
Ғўза	Ширалар, трипслар	0,6		20 (3)
	Ўргимчаккана	1,2		40 (3)
	Оққанот	1,5 - 2,0	50 - 60 (3)	
Олма, нок, беҳи олча, гилос, олхўри	Узунбурун қўнғизлар, каналар, мевахўрлар, баргўрар куртлар, ширинчалар, арракашлар, қалқондорлар, сохта қалқондорлар	1,0 - 3,0	1 000	10 - 30 (1)
Ток	Унсимон куртлар, каналар	1,0 - 2,6		10 - 26 (1)
Бодринг, помидор	Пашшалар, ширалар, трипслар	0,6 - 1,2		6 - 12 (1)
	Оққанот	1,5 - 2,0	15 - 20 (1)	

ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР

ЭНВИДОР СПИД 24% сус.к.

Ишлаб чиқарувчи: Байер АГ (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: Спиродиклофен, 222 г/л + абамектин, 18 г/л

Препарат шакли: Суспензия концентрати

Каналарнинг барча ривожланиш босқичлари-тухумлари, нимфалари ва етук авлодларига қарши юқори самарали ва шира трипс, ғуза тунламининг бошланғич авлоди ва ғовакловчи пашшалар учун 2 та таъсир моддасига эга янги инсектоакарицид



Қадоғи: 0,3л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Олма	Каналар	0,25	1000	2,5 (1)

ФУНГИЦИДЛАР

АЛЬЕТТ 80% с.д.г.

Ишлаб чиқарувчи: Байер АГ (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: Фосетил алюминий

Препарат шакли: Сувда эрувчи гранулалар

Қишлоқ, хўжалик экинларида оомицет замбуруғлар ва бактериялар кузғатадиган касалликларга қарши ишлатиладиган тизимли таъсир қилувчи фунгицид



Қадоғи: 1кг

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Олма	Бактериал куйиш	1,5-3,0	1 000	15-30 (1)
Помидор	Фитофтороз	1,5- 2,0	300	50-70 (3)
Картошка				
Бодринг	Пероноспороз	2,0		70 (3)

ФУНГИЦИДЛАР

АНТРАКОЛ 70% С.Э.Г.

Ишлаб чиқарувчи: Байер АГ (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: Пропинеб

Препарат шакли: Сув эрувчи гранула

Қишлоқ, хўжалик экинларида фитопатоген замбуруғлар қўзғатадиган жуда кўп касалликларига қарши ишлатиладиган контакт таъсирли фунгицид



Қадоғи: 0,5кг

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Олма	Калмараз	1,5-2,0	1 000	15-20 (1)
Ток	Милдью, антракноз			
Картошка	Фитофтороз, альтернариоз	2,0	300	50-70 (3)
Помидор				
Бодринг	Пероноспороз	2,0	300	70 (3)
Пиёз				

ФУНГИЦИДЛАР

БЕНОРАД 500 г/кг н.кук.

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО Фирма "Август" Россия

Таъсир этувчи моддаси: Беномил 500 г/кг

Препарат шакли: Намланувчи кукун

Бенорад юқори даражада системали таъсирга эга эканлиги тўфайли, уни ҳам ўсув даврида ўсимликларга пуркаш учун, ҳам уруғларни дорилаш учун қўллаш мумкин. Препарат кўп сонли экинларда кенг қўламдаги касалликларнинг олдини олиш (профилактик) ҳамда ушбу касалликларни даволаш таъсирларига эга.



Қадоғи: 3 кг

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Помидорлар	Қўнғир доғланиш (марсонияз)	2-3	300	70 (3)
Олма	Ун-шудринг, парша	1-2	800-1000	20 (1)

ФУНГИЦИДЛАР

ИМПАКТ 25% сус.к.

Ишлаб чиқарувчи: FMC (АҚШ)

Таъсир этувчи моддаси: Флутриафол

Препарат шакли: Суспензия концентрати

Қишлоқ, хўжалик экинларининг ҳар хил касалликларига қарши ишлатиладиган контакт ва системали таъсир қилувчи самараси юқори булган фунгицид



Қадоғи: 5л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Олма	Ун шудринг, калмараз	0,1	1 000	1 (1)
Кузги бўғдой	Занг (сарик, қўнғир, поя), ун шудринг	0,25 - 0,5	300	8 - 16 (3)
Ток	Оидиум	0,1 - 0,15	1 000	1 - 1,5 (1)

ФУНГИЦИДЛАР

КОЛОСАЛЬ 25 % ЭМ.К.

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО Фирма "Август" Россия

Таъсир этувчи моддаси: Тебуконазол

Препарат шакли: Эмульсия концентрати

КОЛОСАЛЬ улкан ҳосил!

Таъсир кўлами кенг, системали, тез таъсир қилувчи, самараси узоқ давом этадиган, ғалла, ток ва бошқа экиларнинг касалликларига қарши ишлатиладиган олдини олувчи, ҳимояловчи ва даволовчи фунгицид.

Ишлов берилган вақтдан бошлаб экинларни касалликлардан 4-5 ҳафта ҳимоя қилади, ёмғир ёққанида ювилиб кетмайди.



Қадоғи: 5л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Кузги буғдой	Ун шудринг, сариқ ва қўнғир занг, сариқ доғланиш, септориоз	0,3-0,5	300	10-15 (3)
Ток	Оидиум	0,15	1000	2,0 (1)

БАКТЕРИАЛ КУЙДИРГИДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШДА БИЗНИНГ ДАЛИЛИМИЗ!



КАЗУМИН 2L с.э

СЕРЕНАДА АСО

КУМИР сус.к.

МЕДЯН 50% с.п.

**МЕДЯН ЭКСТРА
350г/л сус.к.**

ФУНГИЦИДЛАР

КАЗУМИН 2L с.э.

Ишлаб чиқарувчи: Хокко Кемикал Индастриз (Япония)

Таъсир этувчи моддаси: Касугамицин гидрохлорид гидрати, антибиотик, streptomycetes kasugaensis бактериясини ферментация қилиб олинган маҳсул, биопрепарат

Препарат шакли: Сувли эритма

Казумин 2L даволовчи фунгицидлик ва бактерицидлик таъсирларига эга бўлиб, қишлоқ хўжалик экинларида бактериялар ҳамда фитопатоген замбуруғлар қузғатадиган касалликлардан, жумладан шолони пирикулярриоздан ҳимоя қилиш учун қўлланилади.



Қадоғи: 5л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Олма	Бактериал куйдирги	3,0-4,0	1 000	30 - 40 (1)

ФУНГИЦИДЛАР

КУМИР 345 г/л сус.к.

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО Фирма "Август" Россия

Таъсир этувчи моддаси: Уч-асосли мис сульфати, 345 г/л

Препарат шакли: Суспензия концентрати

Кумир таркибида мис бўлган ноёб, юқори самарали фунгицид бўлиб, у сабзавот экинлари, мевали дарахтлар ва токни кўп сонли касалликлардан, жумладан картошкани фитофтороз ва альтернариоздан, мевали дарахтларни калмараз (парша) ва монилиоидан, токни сохта ун-шудрингдан (милдью касаллигидан) ҳимоя қилишда уйғунлашган кураш тизимида қўллаш учун тавсия қилинган. Ишловнинг самараси энг юқори бўлиши учун Кумир препаратини ўсимликлар касаллик билан зарарланишидан олдин қўллаш лозим. Препарат ишловдан кейин дарҳол таъсир қила бошлайди.



Қадоғи: 10 л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Олма	Парша, монилиоид	5	800-1000	50 (1)
Грек ёнғоғи	Қўнғир доғланиш (марсонид)	15-20		150-200 (1)
Ток	Милдью	5-6		50-60 (1)

ФУНГИЦИДЛАР

ЛУНА ЭКСПИРИЕНС 40% К.С.

Ишлаб чиқарувчи: Байер АГ (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: Флуопирам 200 гр/л +тебуконазол 200гр/л

Препарат шакли: Суспензия концентрати

Янги сабзавотларга ёрқин ҳаёт бағишланг!

Таркибида даволовчи, олдини оловчи ва қириб битирувчи фаолликка эга бўлган иккита таъсир этувчи бирикмалари мавжуд бўлган янги инновацион, қурама препарат бўлиб, замбуруғлар қўзғатадиган касалликларнинг кенг қўламини назорат қилади, йиғилган ҳосилни узоқ сақлашга имкон яратади ҳамда стандарт ҳосил олинишини таъминлайди.



Қадоғи: 1л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Олма	калмараз, ун-шудринг ва мева чиришларига қарши ишлатилади.	0,75-1,0	1000	7,5-10 (1)

ФУНГИЦИДЛАР

МЕТАКСИЛ СП н.кук.

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО Фирма "Август" Россия

Таъсир этувчи моддаси: Манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг

Препарат шакли: Намланувчи кукун, сувда эрийдиган пакетларда

Метаксил, таркибида иккита таъсир этувчи модда бўлган фунгицид, картошка, помидор, бодринг, пиёз, ток ва бошқа экинларнинг кўп сонли касалликларига (фитофтороз, альтернариоз, пероноспороз, милдью) қарши қўллаш учун ишлаб чиқарилган. Таъсир механизми икки хил – контакт ва системали – эканлиги туфайли экинларни ҳам ташқарисидан, ҳам ички қисмидан зарарланишдан узоқ вақт давомида химоя қилади. Метаксил олдини олувчи (профилактик), даволовчи ва қириб битирувчи, контакт-системали таъсирларни намоён қилади.



Қадоғи: 2 кг

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Токзорлар	Милдью	2,5- 3	800-1000	25-30 (1)
Помидор	Фитофтороз, альтернариоз	2,5	300-500	50 (3)
Бодринг	Пероноспороз			
Пиёз (барра пиёздан ташқари)				
Картошка	Фитофториоз, альтернариоз	2 - 2,5	400	50 (3)

ФУНГИЦИДЛАР

ПРЕВИКУР ЭНЕРЖИ 840 г/л с.э.к.

Ишлаб чиқарувчи: Байер АГ (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: Пропамокарб, 530 г/л + фосетила, 310г/л

Препарат шакли: Сувли эритма

Икки компонентли фунгицид бўлиб, касалликдан асраб ўсувни бошқариш хусусиятига эга таниш маҳсулотнинг янги авлоди



Қадоғи: 1л.

Экин тури	Ишлатиш усули	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Помидор ва бодринг	Пуркаш орқали	Фитофтороз, альтернариоз	2,5	1 000	25 (1)
	Илдиз орқали	Илдиз чириш		3 000	8(хар бир тупга 0,1 грамдан)

ФУНГИЦИДЛАР

СЕРЕНАДА АСО

Ишлаб чиқарувчи: Байер АГ (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: *Bacillus amyloliquefaciens* штамма QST 713

Препарат шакли: Суспензия концентрати

Серенадо АСО биологик бактерицид фаолликка эга фунгицид бўлиб, баргларга ва тупроққа пуркаш усули билан қўлланганида экинларни патогенларнинг кенг қўламидан комплекс ҳимоя қилади.

Препаратнинг ноёб биологик таъсир механизми патогенларда чидамлилиқ ҳосил бўлишининг олдини олади.



Қадоғи: 5л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Олма	калмараз, мева чиришлари, бактериал куйдирги	5-8	1000	50-80 (1)
Помидор иссиқхонада ва очик далада	қора доғланиш, бактериал доғланишлар, альтернариоз, фитофтороз (касалликлар кучсиз ёки ўртача даражада ривожланганида) қўлланилади.			

ФУНГИЦИДЛАР

ТАЛАНТ 500 г/л сус.к.

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО Фирма "Август" Россия

Таъсир этувчи моддаси: Хлороталонил, 500 г/л

Препарат шакли: Суспензия концентрати

Талант картошка ва помидорнинг асосий касалликларига қарши ишлатиладиган контакт таъсирли ҳимояловчи фунгициддир. Таъсир механизми носпецифик эканлиги туфайли, Талант патогенларда чидамлик пайдо бўлишини чақирмайди, шу сабабдан ушбу препарат комплекс ҳимоя тизимларининг муҳим қисми бўлиб, ўсимликлар ҳимоясида антирезистентлик дастурларига киритилган.



Қадоғи: 10 л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Помидор	Фитофториоз, альтернариоз	2,5 - 3	300-500	80-100 (3)
Картошка		2,2 - 3		

ФУНГИЦИДЛАР

ТОПСИН-М 70% н.кук.

Ишлаб чиқарувчи: Ниппон Сода (Япония)

Таъсир этувчи моддаси: Тιοфанат-метил

Препарат шакли: Намланувчи кукун

Ун шудринг, чириш ва бошқа замбуруғли касалликларга қарши тизимли фунгицид



Қадоғи: 1кг

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Бодринг	Ун-шудринг, кулранг чириш	1,0	1 000	10 (1)
Олма	Ун-шудринг, калмараз			
Ток	Оидиум, антракноз	1,0-1,2	300	30-40 (3)
Шоли	Пирикуляриоз			

ФУНГИЦИДЛАР

ФАЛЬКОН 46% ЭМ.К.

Ишлаб чиқарувчи: Байер АГ (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: Тебуконазол+спироксамин+триадименол

Препарат шакли: Эмульсия концентрати

Ўсимликларни ҳимояловчи, даволовчи ва патогенларни қирувчи хусусиятига эга бўлган таркибида 2та кимёвий синфига қирувчи 3та таъсир этувчи моддасига самараси юқори бўлган ягона фунгицид



Қадоғи: 5л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Ток	Сариқ ва қўнғир занг, ун-шудринг, барг доғланиши	0,4	300	13 (3)
Кузги буғдой	Оидиум	0,3	1 000	3 (1)

ФУНГИЦИДЛАР

ФЛИНТ 50% с.э.г.

Ишлаб чиқарувчи: Байер АГ (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: Трифлуксистробин

Препарат шакли: Сувда эрувчан гранула

Янги, стробилуринлар кимёвий синфига мансуб бўлган
янги авлод фунгициди



Қадоғи: 0,15 кг

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Олма	Калмараз	0,15	1 000	1,5 (1)
Ток	Оидиум			

ФУНГИЦИДЛАР

ФОЛИКУР 25% ЭМ.К.

Ишлаб чиқарувчи: Байер АГ (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: Тебуконазол

Препарат шакли: Эмульсия концентрати

Қишлоқ хўжалик экинларини кўп касалликларига қарши ишлатиладиган тизимли фунгицид



Қадоғи: 5л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Ток	Оидиум	0,3	1 000	3 (1)
Олма	Ун шудринг	0,5		5 (1)

УРУҒЛАРНИ ЭКИШДАН ОЛДИН ДОРИЛАШДА ҚУЛЛАНИЛАДИГАН ПРЕПАРАТЛАР

ВИТАРОС 34% сус.к.

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО Фирма «Август» Россия

Таъсир этувчи моддаси: Карбоксин 198г/л+тирам 198г/л

Препарат шакли: Суспензия концентрати

Экинларни 100% ҳимоя қилади!

Комплекс таркибли уруғ дориллагич, ўсишни жадаллаштируви восита, контакт ва системали таъсирга эга, экинлар уруғларини ички ва ташқи инфекциядан ҳимоялашда ҳамда ғалла экинлари ва ғўза илдизлари зонасида тупроқ инфекциясини назорат қилишда тенгсиз самарага ва устунликка эга



Қадоғи: 10 л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, л/т уруғ	Ишлатиш муддати, усули ва тавсия этилган чекловлар, л/т уруғ
Кузги бугдой	Чанг ва қаттиқ қорақуя, илдиз чириш	2,0-2,5	Уруғ препарат суспензиясида 1 т донга 10 л эритма сарфланган ҳолда дориланади
Ғўза	Илдиз чириш, гоммоз	5,0	Чигит препарат суспензиясида 1 т тукли чигитга 25-30 л ва 1 т механик усулда туксизлантирилган чигитга 15-20 л эритма сарфлаб дориланади

НИҲОЛЛАРИНГИЗ МУАМОЛАРСИЗ УНАДИ!

ТАБУ СУПЕР 500 г/л сус.к.



ВИТАРОС 34% сус.к.

УРУҒЛАРНИ ЭКИШДАН ОЛДИН ДОРИЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ПРЕПАРАТЛАР

ТАБУ СУПЕР 500 г/л сус.к.

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО Фирма "Август" Россия

Таъсир этувчи моддаси: Имидаклоприд, 400 г/л + Фипронил 100 г/л

Препарат шакли: Суспензия концентрати

ТАБУ СУПЕР – таркибида иккида таъсир этувчи моддаси бўлган, ер устида ва тупроқда ҳаёт кечирадиган зараркунандаларга қарши қўлланиладиган, самараси ва рентабеллиги бўйича тенги йўқ инсектицид уруғ дориллагичдир. Зараркунандаларда чидамлилик ривожланиши хавфини камайтиради, уларнинг неоникотиноидлар ва пиретроидларга чидамли популяцияларини ҳам самарали назорат қилади. Экинни ҳимоя қилиш технологиясини оптималлаштиради ва ўсимликлар ривожланишининг эрта босқичларида инсектицид пуркаш талаб этилмаслиги туфайли, ҳимоя ўтказиш ишларининг харажатларини камайтиради. Уруғликка экишдан олдин Табу Супер билан ишлов берилганида алмашлаб экишда ўстириладиган экинларни сўрувчи ва кемирувчи зараркунандалардан узоқ вақт давомида тўла ҳимоя қилади. Илдизни кемириб, қирқувчи тунламларнинг барча ёшдаги зотларини ишловдан кейин бир зумда ўлдиради. Тупроқда ва ер устида ҳаёт кечирадиган зараркунандаларни ишончли равишда назорат қилади. Препаратнинг таъсир муддати узун.



Қадоғи: 5л.

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, л/т уруғ	Ишлатиш муддати, усули ва тавсия этилган чекловлар, л/т уруғ
Ўйза	Илдиз қырқар куртлар, шира, трипс	6-8	Чигит препарат суспензиясида 1 т тукли чигитга 18 л ва 1 т механик усулда туксизлантирилган чигитга 18 л эритма сарфлаб дориланади

УРУҒЛАРНИ ЭКИШДАН ОЛДИН ДОРИЛАШДА ҚУЛЛАНИЛАДИГАН ПРЕПАРАТЛАР

ТАБУ 500 г/л с.сус.к.

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО Фирма "Август" Россия

Таъсир этувчи моддаси: Имидаклоприд, 500 г/л

Препарат шакли: Сувли суспензия концентрати

Табу қишлоқ хўжалик экинлари уруғларини майсаларни зарарловчи зараркунандалар комплексидан ҳамда ўсимликларнинг тупроқ усти қисмлари ва илдиз тизимини шикастовчи зараркунандалардан ҳимоя қилувчи, юқори самарали, системали таъсирли инсектицид уруғ дорилагичдир. Табу ҳар қандай атроф-муҳит шароитларида ҳам узоқ вақт (45 кунгача) давомида зараркунандаларни нобуд қилиб туради ва бу билан фермерлар ўсув даврида инсектицидлар билан ўтказиладиган ишловларнинг бир нечтасидан воз кечишига, яъни воситаларни тежашига шароит яратади.



Қадоғи:5л.

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, л/т уруғ	Ишлатиш муддати, усули ва тавсия этилган чекловлар, л/т уруғ
Ўйза	Шира, трипслар	7,0	Чигит препарат суспензиясида 1т тули чигитга 25-30л ва 1т механик усулда туксизлантирилган чигитга 15-20 л эритма сарфлаб дориланади

УРУҒЛАРНИ ЭКИШДАН ОЛДИН ДОРИЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ПРЕПАРАТЛАР

СИНКЛЕР 75 г/л сус.к.

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО Фирма "Август" Россия

Таъсир этувчи моддаси: Флудиоксонил, 75 г/л

Препарат шакли: Суспензия концентрати

Синклер ҳар хил экинларнинг уруғларини ва картошка туганакларини касалликларнинг кенг қўламидан, жумладан, уруғ ҳамда тупроқ орқали ўтувчи патогенлар қўзғатадиган илдиз чиришларидан ҳимоя қилиш учун қўлланиладиган, экишдан олдин дорилаш учун ишлатиладиган, қуюқлаштирилган, юқори самарали уруғ дорилагич фунгициддир. Синклер тупроқ патогенларидан узоқ вақт давомида ҳимоя муддатига эга ҳамда у уруғларнинг униш энергиясини ва юқори унвчанлигини кафолатловчи, иммунитетини кучайтирувчи таъсирларни намоён қилади. Синклер экинларни узоқ муддат (12 ҳафтагача) ҳимоя қилади. Препаратни Табу ва Табу Супер инсектицид уруғ дорилагичлари билан бирга қўллаш мумкин.



Қадоғи:5л.

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, л/т уруғ	Ишлатиш муддати, усули ва тавсия этилган чекловлар, л/т уруғ
Картошка	Ризоктониоз, фузариоз	0,2 -0,3	1 т уруғлик картошка препарат суспензиясида 10л эритма сарфланган ҳолда дориланади

УРУҒЛАРНИ ЭКИШДАН ОЛДИН ДОРИЛАШДА ҚУЛЛАНИЛАДИГАН ПРЕПАРАТЛАР

ЭМЕСТО КВАНТУМ сус.к.

Ишлаб чиқарувчи: Байер АГ (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: Клотиаинидин 207 г/л+пенфлуфен 66,5 г/л.

Препарат шакли: Суспензия концентрати

Картошка етиштириш технологиялари 100 ёшга тўлди!

Муваффақиятинг тарихини қоғозга тушир!

Картошкани кемирувчи ва сўрувчи зараркунандалардан ҳамда уруғ орқали ўтадиган ва тупроқда сақланадиган касалликлардан ҳимояловчи, “ичидаги иккита куч” таъминлайдиган антистресс фаолликка ва ўсимлик ўсишини юқори даражада жадаллаштириш қобилиятига эга бўлган инновацион, системали ва трансламинар таъсирли инсектицид-фунгицид уруғ дориси; кўчатлар равон ва тез униб чиқишини таъминлайди ва маҳсулот чиқишини кўпайтиради.



Қадоғи: 10л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	Ишлатиш муддати, усули ва тавсия этилган чекловлар
Картошка	Симқуртлар, колорадо қўнғизи, ширалар, ризоктониоз, кумушранг ва оддий калмаразга қарши ишлатилади.	0,3-0,35	1 т уруғлик картошка препарат суспензиясида 10л эритма сарфланган ҳолда дориланади

ГЕРБИЦИДЛАР

АТЛАНТИС 3,6% В.Д.Г.

Ишлаб чиқарувчи: Байер АГ (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: Мезосульфурон-метил натрий+йодосульфурон-метил натрий

Препарат шакли: Сувда эрувчи гранулалар

Бир йиллик икки паллали ва бошоқли бегона ўтларга қарши юқори самарадорликни таъминлайди. Райгрес (мастак), Ёввойи Сули (Оқ Бош), Тулки Қуйрук;, Итқуноқ турлари, Курмак, Эшакшўра, Жағ-жағ, Шўра, Сассиқпоя, Қуртэна, Салатўт, Чумчуқтили, Мойчечак, Лолақизғалдоқ; Ёввойи турп, Аччиқут, Юлдузўт, Тиласпи, Олабўта, Аччиқмия, Қизилтасма, Бангидевона, Исмалоқ каби ўтларга қарши самарадорлиги юқори.



Қадоғи: 0,6кг.

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Кузги бугдой	Бир йиллик икки паллали ва бошоқли бегона ўтлар (шу жумладан, ёввойи сули ва райграс)	0,25-0,3 + биопауэр 1,0	300	8-10 (3)

ГЕРБИЦИДЛАР



ATLANTIS[®]
WG

БАЙЕРДАН ШЕДЕВР !

ГЕРБИЦИДЛАР

АЛИОН 500 г/л сус.к.

Ишлаб чиқарувчи: Байер АГ (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: Индазифлам

Препарат шакли: Суспензия концентрати

3 йилдан катта бўлган бог ва узумзорлардаги бегона ўтларга қарши ёппасига таъсир этувчи янги авлод гербициди



Қадоғи: 0,1л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Олма, ток	Бир ва кўп йиллик бошоқли ва икки паллали бегона ўтлар	0,1	300	3 (3)

ГЕРБИЦИДЛАР

АСИФАТ 500 г/л с.э.

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО Фирма "Август" Россия

Таъсир этувчи моддаси: Глифосат кислотасининг изопропиламин тузи, 500 г/л

Препарат шакли: Сувли эритма

Асифат ялпи таъсирли, таъсир этувчи моддасининг юқори миқдорига эга бўлган, бегона ўтларнинг илдиз тизими ва ер усти қисмларини максимал даражада ва самарали ўлдирадиган, универсал, системали гербициддир. Асифат кўп йиллик илдизпояли ва илдизбачкили бегона ўтларга қарши курашда кузги ишлов ўтказишда энг аъло (идеал) ечимдир; айна пайтда алмашлаб экиш тизимида Асифат экинлар учун умуман ҳеч қандай хавф туғдирмайди.



Қадоғи: 10 л

Экин тури	Қайси бегона ўттарга қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Кузги буғдой	Бир йиллик ва кўп йиллик икки паллали ҳамда бошоқли бегона ўтлар	3,0-4,0	300	100-140 (3)
Ѓўза				
Ток				
Қишлоқ хўжалик экинлари экиш режалашти-рилган далалар				
Қишлоқ хўжалигида фойдаланил-майдиган ерлар				

ГЕРБИЦИДЛАР

ГАЙТАН 33 % сус.к.

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО Фирма «Август» Россия

Таъсир этувчи моддаси: Пендиметалин 330 г/л

Препарат шакли: Эмульсия концентрати

Ўсиш бошиданоқ бегона ўтлардан ҳимоя!

Ғўза, маккажўхори, пиёз, картошка ва тамаки экинларида майсалар униб чиқишидан олдин бир йиллик бошоқли ва икки паллали бегона ўтларга қарши қўлланиладиган ва узоқ вақт давомида экинни ҳимояловчи гербицид. Бегона ўтларга қарши самарали гербицид “экрани” ҳосил қилиш орқали улар униб чиқишининг олдини олади. Маданий ўсимликларга юқори даражада танлаб таъсир қилади.



Қадоғи: 10л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Ғўза, маккажўхори, сабзи, картошка, тамаки	Бир йиллик бошоқли ва икки паллали бегона ўтлар	3,0-6,0	300	100-200 (3)
Пиёз	Бир йиллик бошоқли ва икки паллали бегона ўтлар	2,3-4,5		80-150 (3)

ГЕРБИЦИДЛАР

ГАМБИТ 50% сус.к.

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО Фирма «Август» Россия

Таъсир этувчи моддаси: Прометрин

Препарат шакли: Суспензия концентрати

Тупроқ гербицидлари орасида тан олинган стандарт!

Системали таъсирли, ишлов бериладиган экинларга нисбатан юқори даражада танлаб таъсир қилувчи, бегона ўтларга тез таъсир қилиб, самараси узоқ вақт давомида сақланувчи ҳамда бир йиллик икки паллали ва бошоқли бегона кенг кўламига қарши ишлатиладиган гербициддир. Ишлов даврини (экишгача, экиш билан бирга ёки экин кўчатлари униб чиқишидан олдин) танлаш имконини беради, алмашлаб экиш схемасида кейинги экинларга салбий таъсир қилмайди.



Қадоғи: 10л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Ѓўза	Бир йиллик икки паллали ва бошоқли бегона ўтлар	3,0-5,0	300	100-160 (3)
Пленка остига экилган ғўза	Бир йиллик икки паллали ва бошоқли бегона ўтлар	1,0-2,0		35-70 (3)
Сабзи	Бир йиллик икки паллали ва бошоқли бегона ўтлар	2,0-3,0		70-100 (3)
Картошка	Бир йиллик икки паллали ва бошоқли бегона ўтлар	3,0-4,0		100-130 (3)
Маккажўхори	Бир йиллик икки паллали ва бошоқли бегона ўтлар	2,0-3,5		70-120 (3)

ГЕРБИЦИДЛАР

ГРАНСТАР МЕГА 75% с.э.г.

Ишлаб чиқарувчи: FMC (АҚШ)

Таъсир эрувчи моддаси: Трибенурон-метил + тифенсульфурон-метил

Препарат шакли: Сувда эрувчи гранулалар

Гранстар Мега – буғдойзорларда бегона ўтларга қарши қўллаш учун тизимли таъсирли, юқори даражада танлаб таъсир қилувчи гербициддир. Таъсир этувчи моддалари: Трибенурон-метил + Тифенсульфурон-метил. Кенг баргли, жумладан йўқотиш қийин бўлган бегона ўтларга таъсири такомиллаштирилган препарат. Ишлов бериладиган экинга нисбатан юқори даражада танлаб таъсирли. Ишлов бериш муддатларининг доираси кенг. Алмашлаб экиш схемаларида қўллаш учун чекловлари йўқ.



Қадоғи: 0,5 кг

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Кузги буғдой	Қўп йиллик икки паллали бегона ўтлар	0,03	300	1 (3)

ГЕРБИЦИДЛАР

ЗЕНКОР УЛЬТРА 600 г/л

Ишлаб чиқарувчи: Байер АГ (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: Метрибузина

Препарат шакли: Суспензия концентрати

Бегона ўтлар билан курашда чемпион!

Зенкор Ультра бир йиллик икки паллали ва бошоқли бегона ўтларга қарши ишлатиладиган системали, таъсир кўлами кенг гербициддир.

Ҳам тупроққа солинганида, ҳам униб чиққан бегона ўтларга пуркалганида юқори самара беради. Препаратнинг тупроқда экран ҳосил қилиш қобилияти мавжудлиги узоқ вақт давомида бегона ўтлар қайтадан ўсиб чиқишининг олдини олади.



Қадоғи: 5л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Картошка	Бир йиллик икки паллали ва бошоқли бегона ўтларга қарши.	0,6-1,2 +0,35	300	20-40 (3)
	Препаратни икки усулда қўллаш мумкин:	0,8-0,9		25-30 (3)
Помидор кўчатларида	Бир йиллик икки паллали ва бошоқли бегона ўтларга қарши	0,8-1,4		25-50 (3)

ГЕРБИЦИДЛАР

МАЙСТЕР ПАУЭР 57,5 г/л м.д.

Ишлаб чиқарувчи: Байер А.Г. (Германия)

Таъсир этувчи моддаси: Форамсульфурон 31,5 г/л+йодосульфурон-метил-натрий 1 г/л
+тиенкарбазон-метил 10 г/л + ципросульфамид 15г/га (антидот)

Препарат шакли: Суспензия концентрати

Маккажўхори далаларида бегона ўтларнинг барчасини тўла назорат қиладиган, бегона ўтлар униб чиққанидан кейин қўлланиладиган универсал гербицид. Маккажўхори далаларидаги бегона ўтларнинг барча турларига нисбатан юқори самарали. Бак аралашмаларини қўллашга ҳожат қолмайди. Тупроқда “экрэн” ҳосил қилиши туфайли, бегона ўтларнинг иккинчи тўлқинини ҳам назорат қилади. Препаратив шакли янги (мойли дисперсия) бўлиши ўсаётган бегона ўтларни “қўйдириш” хусусияти билан таъминлайди. Ёпиштирувчи бирикмаларни қўллашга ҳам ҳожат йўқ. Янги авлод антидоти мавжудлиги туфайли экинга таъсири жуда “юмшоқ”. Маккажўхорида ишлатиладиган барча танлаб таъсир қилувчи гербицидлар орасида бегона ўтларни назорат қилишининг самараси бўйича Майстер Пауэр рекордсмен ҳисобланади. Тавсия қилинган муддатларда ва энг юқори сарф-меъёрларини ишлатганда маълум бўлган бегона ўт турларининг барчасини назорат қилади. Ҳимоя қилиш муддати: бутун ўсув даврида ҳимоя қилади. Бегона ўтлар гербицид қўлланилганидан кейин деярли ўша заҳоти ўсишдан тўхтайдди. Гербициднинг кўзга яхши кўринадиган таъсири бир неча суткадан кейин яққол намоён бўлади. Бегона ўтлар ишловдан кейин 2-3 ҳафта сўнгра тўла нобуд бўлади.



Қадоғи: 5л.

Экин тури	Қайси бегона ўтларга қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Маккажўхори (қўк масса, дон олиш ёки силос тайёрлаш учун)	Бир ва кўп йиллик икки паллали ва бошоқли бегона ўтлар	1,25-1,5	300	40-50 (3)

ГЕРБИЦИДЛАР



ГЕРБИЦИДЛАР

КОРСАР 480 г/л с.э.к.

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО Фирма "Август" Россия

Таъсир этувчи моддаси: Бентазон 480 г/л

Препарат шакли: Сувда эрувчи концентрат

Корсар ғалла, дуккакли экинлар ва ем-хашак экинларининг далаларида тарқалган кўп сонли икки паллали бегона ўтларга қарши экин униб чиққанидан кейин қўлланиладиган гербициддир. Корсар препаратининг қўллаш муддатини танлаш осон ва бу препарат экинларни ишлов беришдан сўнг дарҳол ҳамда бегона ўтлар янгида ўсиб чиқишигача ҳимоя қилади. Экинлар Корсар билан ўтказиладиган ишловга юқори даражада бардошли.



Қадоғи: 10 л

Экин тури	Қайси зараркунандага қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Шоли	Ҳилол	2-4	200	100-200 (1)

ГЕРБИЦИДЛАР

МИУРА 12,5 % ЭМ.К.

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО Фирма «Август» Россия

Таъсир этувчи моддаси: Хизалофоп-П-этил

Препарат шакли: Эмульсия концентрати

Жангчиларнинг асл зотидан бўлган граминицид!

Ғўза, пиёз, картошка, сабзи ва лавлаги экинларида майсалар униб чиқишидан кейин бир ва кўп йиллик бошоқли бегона ўтларга қарши қўлланиладиган танлаб таъсирли, системали таъсирли гербицид.

Бегона ўтларнинг тўқималарига тез сўрилади, новдалари ва илдизпояларининг ўсув нуқталарига етиб боради ва уларни ўлдиради.

Икки паллали бегона ўтларга қарши ишлатиладиган гербицидлар билан бак аралашма шаклида қўллашга мос келади.



Қадоғи: 5л

Экин тури	Қайси бегона ўтларга қарши ишлатилади	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Ғўза	Бир йиллик бошоқли бегона ўтлар	0,6 - 0,8	300	20-25 (3)
	Кўп йиллик бошоқли бегона ўтлар	0,8 - 1,2		25-40 (3)
Қанд лавалаги, сабзи, картошка, пиёз	Бир йиллик бошоқли бегона ўтлар	0,6 - 0,8		20-25 (3)
	Кўп йиллик бошоқли бегона ўтлар	0,8 - 1,2		25-40 (3)

ДЕФОЛИАНТ

АВГУРОН ЭКСТРА 540 г/л

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО Фирма «Август» Россия

Таъсир этувчи моддаси: Тидиазурон, 360 г/л + диурон, 180 г/л

Препарат шакли: Суспензия концентрати

Тез таъсир қилувчи, ғўза учун №1

Юқори самарали дефолиацияни таъминлайди, машина билан пахта теришни осон қилади таъсир механизми ноёб: барглар яшиллигида тўкилади, шу сабабдан терим пайтида пахта қуруқ барглар қолдиғи билан ифлосланмайди барглар иккиламчи ўсишига йўл қўймайди

Олий навли пахта толаси олишингизга имконият яратади.



Қадоғи: 5л

Экин	Препарат сарф-меъёри, л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	Қўллаш усули ва муддати
Ѓўза	0,1 - 0,2	300	Кўсакларнинг 40-45% очилган даврда ўсимликларга пуркалади

ДЕФОЛИАНТ

**ОЛИЙ СИФАТЛИ, ТЕЗ ВА
ЮМШОҚ ТАЪСИР ЭТУВЧИ!**



ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ЎСИШИНИ БОШҚАРУВЧИ ПРЕПАРАТЛАР

ПЕРЛАН 37,3 г/л с.э.к.

Ишлаб чиқарувчи: Файн Агрокемикал Лимитед (Буюк Британия)

Таъсир этувчи моддаси: А4 ва А7 Гиббереллинлар 18,5 г/л

6-Бензиладенин 18,8г/л

Препарат шакли: Суспензия концентрати

**Ўсимликлар ўсишини тартибга солувчи бирикма (регулятор)
сувда эрувчи концентрат**



Қадоғи: 0,5л

Экин тури	Навлар	Қўллашдан мақсад	Сарф меъёри, кг ёки л/га	1 га учун ишлатиладиган суюқлик сарфи, л/га	10 л сув учун препарат сарфи ва майдони, гр ёки мл (сотих)
Олма	Меваси қизил тусли навлар (Старкинг ва б.)	Йирик, бир хил (стандарт) ўлчамли мевалар ҳосил бўлиши учун: Гуллаш 60-80% тугалланганида 1 марта ишлов берилади	0,6 - 1,0	1 000	6 - 10 (1)
	Меваси сариқ тусли навлар (Голден Делишес ва б.)	Мева қобиғида занг тусли доғлар ҳосил бўлмаслиги учун: 1-ишлов: тўла гуллаш даврида; 2-ишлов: петалар (гулбарглар) тўкилганда; 3-ишлов 2-ишловдан кейин 10 кундан сўнг	0,7		7 (1)
	Меваси сариқ тусли навлар (Голден Делишес ва б.)	Йирик, қобиғи юпқа мевалар ҳосил бўлиши учун: 1-ишлов: Гулларнинг тожбарглари тўкила бошлаган даврда; 2-ишлов: 1-ишловдан кейин 7 кундан сўнг; 3-ишлов: 2-ишловдан кейин 10 кундан сўнг	0,6 - 1,0		6 - 10 (1)
	Кўчатхоналар (барча навлар)	Ёш дарахтлар ва уларнинг мева новдалари тезроқ ўсиши, ривожланиши ва мевага киришини тезлаштириш учун, 1-3 ёшли кўчатларда баҳорда 1 марта ишлов берилади.	2,0		20 (1)
Нок	Уильям (Вильям) ва бошқа навлар	Йирик, бир хил (стандарт) ўлчамли мевалар ҳосил бўлиши учун: 1-ишлов: Гулларнинг тожбарглари тўкила бошлаган даврда; 2-ишлов: 1-ишловдан кейин 7-10 кундан сўнг	0,6		6 (1)

ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ЎСИШНИ БОШҚАРУВЧИ ПРЕПАРАТЛАР

ФАЛГРО

Ишлаб чиқарувчи: Файн Агрокемикал Лимитед (Буюк Британия)

Таъсир этувчи моддаси: 1 таблеткада 1 грамм соф гиббереллин кислотаси

Препарат шакли: Сувда эрувчан таблетка

Ўсимликларнинг ривожланишига кўмаклашувчи восита



Экин тури	Қўллашдан мақсад ва қўллаш пайти	Дозаси 100л сувга
Данаксиз узумлар	Дастурхонга қўйиладиганлари учун: узум доналари йирик бўлиши учун Фалгро таблеткаси қўлланилади. Биринчи қўллаш гул капсулаларининг 70% тўкилганда, иккинчи қўллаш 10-12 кундан кейин узум доналари диаметри 3 мм бўлганда қўлланилади.	2 - таблетка
	Қуритиладиганлари учун: Гул капсулалари тўкилгандан сўнг 4-5 кун ўтиб қўлланилади	1/2 - таблетка
Цитрусли мевалар	Гулларнинг чангланишини рағбатлантириш учун: Айниқса Сатсума ва Клемантин навли мандаринларнинг 75-80% гуллари очилганда тайёрланда эритма гулларга сепилади.	1,5 - таблетка
	Июнь ойидаги тўкилишини олдини олиш учун: ВАЛЕНЦИЯ навли апельсинлардан ташқари бошқа навларда гуллари очилгандан сўнг 4-5 ҳафта ўтиб (тўкилиши бошланишидан 1 ой олдин) тайёрланган эритма ёнғоқ катталигидаги меваларга сепилади.	2 - таблетка
	Ҳосил йигимини кечиктириш учун: Вашингтон навли апельсинларда ранг ўзгариши сезилар сезилмас тайёрланган эритма меваларга сепилади.	1 - таблетка
	Иссиқхоналардаги лимонларда илк ранг ўзгаришида эритма меваларга сепилади ва шу йул билан меваларнинг дарахт устида 2-3 ой қолиши таъминлайди. Грейфрутларда ранг ўзгаришида меваларга сепилади.	1 - таблетка 1,5 - таблетка

ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ЎСИШНИ БОШҚАРУВЧИ ПРЕПАРАТЛАР

ФАЛГРО

Нок	Ҳосилдорлик оз бўлган нок навларида ҳосилдорликни ошириш учун гулларнинг 30% очилганда ва гуллаган пайтда совуқ уришидан сақлаш учун совуқ тушгандан сўнг икки кун ўтиб тайёрланган эритма дарахтга сепади.	1,5 - 2,5 таблетка
Гилос ва олча	Меваларида ранг ўзгариши бошланганда қўлланилади бу меваларининг йирик ва чидамли бўлишига олиб келади.	1,5 - 2 таблетка
Шафтоли	Диксиред ва хале навларида август ойининг илк кунларида тайёрланган эритма сепади чиқилади. Бу баҳорда совуқ тушишидан ҳимоя қилади ва меваларнинг пуслоғини юпқалаштириши ўз ўзидан ҳал қилади.	10 - 15 таблетка
Қулпунай	Ҳосилдорликни ошириш ва меваларни йирик бўлишини таъминлаш учун гул очмасдан 3-4 ҳафта олдин тайёрланган эритма пуркагич билан сепади.	1,5 - 2,5 таблетка
Картошка	Уруғлик сифатида ишлатиладиган картошкалар экишдан олдин тайёрланган эритмага ботирилади ва экилади бу ўсимликнинг тез ва яхши ўсишига олиб келади.	1/2 - 1 таблетка
Салат Латук	Тана ҳосил бўлишини рағбатлантириш учун йиғиб олишдан 7 ва 15 кун олдин қўлланилади. Ҳаво совуқ бўлган ҳолатларда доза оширилади.	1 - 2 таблетка
Қалампир	Ҳосилдорликни ошириш учун гулларнинг ярми мева солганда биринчи марта ва уч ҳафта ўтиб иккинчи марта қўлланилади.	3 таблетка
Декоратив ўсимликлар	Поясининг узун ва гулининг йирик бўлиши учун қўлланилади (чиннигул, атиргул, цикламин, хризантема).	4 - 15 таблетка
Иссиқхонадаги помидор ва бодринг	1) Гулларини кўпайтиради, пуч гулларни тўкилиб кетишидан асрайди ва уларни ҳосил тугувчи гулларга айлантиради. 2) Ўсимлик барглари майдонини кенгайтиради бунинг натижасида фотосинтез жараёни яхшиланади. 3) Томир системаси ривожланади, буни эвазига ҳосил катталиги ва бир ҳиллиги таъминланади, пишиб етилишини 7 кундан 10 кунгача тезлаштиради.	2 таблетка

ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ЎСИШНИ БОШҚАРУВЧИ ПРЕПАРАТЛАР

ЭКЗИЛЛИС

Ишлаб чиқарувчи: Файн Агрокемикал Лимитед (Буюк Британия)

Таъсир этувчи моддаси: 6-бензиладенин 20г/л

Препарат шакли: Суспензия концентрати

**Ўсимликлар ўсишни тартибга солувчи бирикма (регулятор)
сувда эрувчи концентрат**



Қадоғи: 5л

Экин тури	Қўллашдан мақсад ва қўллаш муддати	Дозаси 100л сувга
Олма	Дарахт новдаларини сийраклаштириш ("букетировка") учун. Мева тугунчаларининг диаметри 10-12 мм бўлган даврда қўлланилади.	500-750мл

МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР

СТАРМАКС БОР 150

Ишлаб чиқарувчи: Агронутршн (Франция)



Қадоғи: 10л

ТАРКИБИ – сувда эрувчи моддалар		Ҳажми	Миқдори
N	Азот	3%	42 г/л
Bor	Bor Bor, яққол куриниши B ₂ O ₃	10,9%	150 г/л 483 г/л

Экин тури	Сарф меъёри, л/га	Максимал концентрацияси	Қўллаш муддати
Кунгабоқар	1 - 2	1,5%	5 та чин барг чиқариб гуллаш даврига қадар 1-2 марта ишлов берилади
Мевали дарахтлар	2 - 3	0,8%	Яшил конус Гул барглари тўкилиши Мева қуртак ташкил бўлиши
	4	1,5%	Дарахт танаси уйқуга кетган вақтда ишлов берилади
Узум	2	0,4%	Туп гул
	2	0,4%	Бутонизация
	2	0,6%	Гуллашдан кейин
	4	1,5%	Тиним даври
Сабзавотлилар* (очиқ дала) ва бошқа экинлар	2		Яхши ривожланган барг даврида 1-2 марта ишлов бериш

МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР

СТАРМАКС ГОЛД

Ишлаб чиқарувчи: Агронутришн (Франция)

Таъсир этувчи моддаси: **ЕС-NPK (8.8-2.7-7) В-Cu-Fe-Mn-Mo-Zn** %

Препарат шакли: Эмульсия концентрати



Қадоғи: 10л

Сувда эрувчи элементлар	Масса	Масса/Ҳажми
Азот (N)	8,83%	105г/л
Фосфор ангидриди (P ₂ O ₅)	2,70%	32г/л
Калий оксиди (K ₂ O)	7,02%	83г/л
Магний оксиди (MgO) Хелат EDTA	0,11%	1300мг/л
Бор (B)	0,42%	500мг/л
Мис (Cu) Хелат EDTA	0,12%	140мг/л
Темир (Fe) Хелат EDTA	0,21%	250мг/л
Марганец (Mn) Хелат EDTA	0,42%	500мг/л
Молибден (Mo)	0,042%	50мг/л
Рух (Zn) Хелат EDTA	0,34%	400мг/л

*Ёпиқ далаларда, ўсимликларнинг препаратга нисбатан реакциясини ўрганиш мақса юқори концентрациясини тажриба мақсадида қўллаш

МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР

Стармакс Голд: Қачон ва қандай қўлланилади.
Қўпи билан 5% ёки (100лт сувга) ишлатиш мумкин.

Экин тури	Сарф меъёри, л/га	Қўллаш муддатлари	1га учун иш-латиладиган суюқлик сарфи, л/га	10л сув учун препарат сарфи ва сарф майдони, мл (сотих)
Донлилар	3,0 - 5,0	Найча чиқиши дастлабки этилиши барг ҳосил бўлганда бошоқга кирганда	300	100-150 (3)
Дуккаклилар		5-10 см гуллаш вақтида		
Картошка		3-4 марта ҳар 15 кунда		
Бошқа бир йилликлар (маккажўхори, қизил лавлаги)		Униб чиқишида Об-ҳаво ноқулай келган ҳолатларда ёки ривожланиш сурати пасайганда		
Сабзавотлар (сабзи, помидор, салат барги)		3-4 марта ҳар 15 кунда	1000	30-50 (1)
Узум		Гуллашдан олдин, гуллаганда, шоналаш вақтида, сўнг ҳар 15 кунда		
Мевали дарахтлар		Ҳосилга кирганда ва ҳосил тўлиқ тугганда 3-5 марта		

МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР

СТАРМАКС КАЛЬЦИЙ

Ишлаб чиқарувчи: Агронутришн (Франция)

Фойдаланишга тайёр дастирлар учун Стандарт конфигурация препарати!

Заводни тез қўллаб қувватлаш учун қабул қилинадиган рН.

қўшимча маълумот олиш учун биз билан боғланинг.

Жараённи тез ва осон бажаришингизни таъминлаш учун операция ва қувватни тежаш.

Сақлаш самарадорлигини оширишга имкон беради.



Қадоғи: 10л

ТАРКИБИ – сувда эрувчи моддалар		Ҳажми, %	Миқдори
CaO	Кальций оксиди	10%	186 г/л
Zn	Рух	0,83%	11 г/л
P2O5	Фосфор ангидриди	4,6%	60 г/л

Асосий экинлар	л/га	Сарф меъёри л/га	Қўллаш муддатлари
Уруғ мевали ва данак мевали дарахтлар	4 - 6	6 л, энг юксак концентрацияси – 2%	Мевалар тўла бошлаган пайтдан бошлаб ҳар 15 кунда 1 марта, ҳаммаси бўлиб 5 ишлов берилади. Ишловлар йиғим-теримга 3 ҳафта қолганида тўхтатилади. Олма қобиғида кавакчалар пайдо бўлиши ва мева аччиқлиги касаллигига сезгир навларда мавсумда 7 мартагача
Помидор, салатлар, қовун, пиёз ва бошқа сабзавот экинлари	3 - 6	3-6 л, энг юксак концентрацияси – 1,5%	Яхши ёзилган барглarga ҳар 10-15 кунда 1 марта, ҳаммаси бўлиб 3-5 ишлов берилади
Ток ва бошқа экинлар	4 - 6	6 л, энг юксак концентрацияси – 2%	Яхши ёзилган барглarga ҳар 10-15 кунда 1 марта, ҳаммаси бўлиб 2-4 ишлов берилади

МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР

ОЛИГОМАКС ТЕМИР (Fe 6% EDDHA)

Ишлаб чиқарувчи: Агронутришн (Франция)

Хелатланган темир экинларда темир хлорозига қарши самарали восита



Қадоғи: 5 кг

Асосий экинлар	Сарф меъёри	Бир мавсумда бериладиган сарф меъёри
Ток	Ҳар бир тупга 5-10 г	Мавсум давомида бериладиган препарат миқдорини 2-3 қисмга бўлиб солиш мумкин
Мевали дарахтлар	Ҳар бир дарахтга 30-100 г	Мавсум давомида бериладиган препарат миқдорини 2-3 қисмга бўлиб солиш мумкин
Сабзавотлар,резавор экинлар, гуллар, манзарали ўсимликлар	2-5 г / м ²	50 кг.гача ушбу препарат миқдорини 2-3 қисмга бўлиб, ҳар 15 кунда бир марта солиш мумкин

МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР

ФЕРФОЛЬ (Fe 13% EDTA)

Ишлаб чиқарувчи: Агронутришн (Франция)

Хелатланган темир экинларда темир хлорозига қарши самарали восита



Қадоғи: 20 кг

ЭРКИН ТУРЛАРИ	САРФ МЕЪЁРИ
ДАНАКИ ДАРАХТ /УЗУМ (нозик бартлар буннган мустасно)	200 гр/100 л сувда (гуллагунча) 400 гр/га (гуллагандан кейин)
ШАФТОЛИ (ва бошка сезувчан бартлилар/кулупнай, малина)	200 гр/100 л сувда
САБЗАВОТЛАР МАНЗАРАЛИ ЎСИМЛИЛЛАР/КЎЧАТХОНАЛАР	50-100 гр/100 л сувда
ПОЛИЗ ЭКИНЛАРИ	500 гр/100 л сувда

МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР

ФИКСА МАРГАНЕЦ

Ишлаб чиқарувчи: Агронутришн (Франция)

Суюқ шаклдаги сульфат марганецли ўғит (Mn)

9,1% Марганец (Mn), сувда эрувчанлиги (90 г/л)

Зичлиги: 1,3 Бошқа элементлар: SO₃ 170 гр/л

ИЛДИЗ ОРҚАЛИ: 8 -10 л/га буш тупроққа ва элементлар етишмовчилигига қараб ишлатилади .

*Ёпиқ ердаги экинларда ўсимликнинг ўсиш реакциясига қараб 1,5% концентрацияли дастлабки синов ўтказиш лозим.



Қадоғи: 10л

Экин тури	Сарф меъёри, л/га	Максимал концентрацияси	Ишлатиш даври
Бошоқли экинлар	3,0 2,0	2,5%	1-2 ишлов бериш туплашдан ва бошоқ чиқаргунча Бошоқ чиқаргандан сўнг
Маккажўхори	3,0	2%	1ишлов бериш 4-8 барг чиқариш вақтида
Бошқа экинларда*	3,0	2%	1-2 ишлов бериш ҳар 10-15 кунда
Узум	3,0 - 5,0	0,5%	Профилактика дастури:ишлов бериш гуллагунча ва гуллашидан кейин. Даволаш дастури: 3 ишлов бериш ҳар 10 кунда, биринчи аломатлари пайдо бўлиши билан

МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР

ФИКСА ЦИНК

Ишлаб чиқарувчи: Агронутришн (Франция)

Суюқ шаклдаги микроэлемент Рух (Zn)

9,17% Рух (Zn), сувда эрувчанлиги (120 г/л)

11% Олтингургурт Ангидрид (SO₃), сувда эрувчанлиги (150 г/л)

ТУПРОҚ ОРҚАЛИ: 5-10литр Zn рух элементи етишмаслик даврида

Ёпиқ далаларда, ўсимликларнинг препаратга нисбатан реакциясини ўрганиш мақсадида

1% юқори концентратциясини тажриба мақсадида қўллаш лозим.

Ёш барглар даврида 0,5% максимал концентратциясидан ошмаслиги лозим.



Қадоғи: 10л

Экин тури	Сарф меъёри, л/га	Максимал концентратцияси	Ишлатиш даври
Маккажўхори	3,0	1%	1-2 ишлов бериш 5-6 барг чиқариш вақтида
Мевали дарахтлар Цитрусли (ўриқда қўлланилмайди)	3,0	0,5%	1- ишлов гуллашдан олдин, 2-ишлов мева катталашишида, 3-ишлов теримдан сўнг
Сабзавот экинлари (рух элементи етишмаслик даврида)	3,0 - 5,0	0,5%	2 марта ишлов бериш ўсимликлар баргларининг тўлиқ ривожланган даврида

МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР




КАЛИЙ НИТРАТ
РАСТВОРИН
МАГНИЙ СУЛЬФАТ
МАГНИЙ НИТРАТ
КАЛИЙ СУЛЬФАТ
КАЛЬЦИЙ НИТРАТ
МОНОАММОНИЙ ФОСФАТ
МОНОФОСФАТ КАЛИЙ
ОЛИГАМАКС ТЕМИР
АКВАМИКС
АКВАРИН
10-10-40
18-18-18
20-20-20
13-40-13

ТОМЧИЛАБ СУҒОРИШ ТИЗИМИ

Q17 ММ 6 МИЛ 20 СМ 1,6 Л/С-2000 М
Ясси суғориш шланги



IZ 078 А 16 ММ
Думалоқ шланг улагичи




IZ 009 А Кичик жумрак



IZ 067 В Ясси шланг улагичи



ТОМЧИЛАБ СУҒОРИШ ТИЗИМИ



ТОМЧИЛАБ СУҒОРИШ ТИЗИМИ

Q 16 MM-20 CM-4 Л/С-400 М
Думалоқ суғориш шланги

Q 16 MM-25CM-4 Л/С-400 М
Думалоқ суғориш шланги

IZ 019 A Тўхтатиш тиқини

Сомон ўраш ипи

Иссикхона шпагати
100% фибрилизе



ТОМЧИЛАБ СУҒОРИШ ТИЗИМИ



УРУҒЛАР

F1 Темп

Очиқ ва епик дала учун мўлжалланган эрта пишар дурагай, техник етуқлиги 85-95 кун оч яшил рангда, биологик етуқлиги 100-110 кун кизил ранг, палак баландлиги 60-70 см, шохлаши ўрта, мевалари конуссимон, силлик, ялтироқ. Мева оғирлиги 100-120 гр, деворининг қалинлиги 4-5 мм, 3-4 камерали. Ўзгарувчан иқлим шароитларига мослашувчан. Маҳаллий бозор, экспорт ва ишлаб чиқариш учун мулжалланган. Касалликларга чидамийлиги вертициллез сўлиш (Va, Vd). Экиш схемаси 70x25 см. Хосилдорлиги 4-6 кг/м2 очик далада, 8-9 кг/м2 епик далада.



F1 Юбилейный Семко®

Эртапишар дурагаи, ерга утказилган кундан биринчи хосилгача 70 кун, палак баландлиги 60 см, палаги ихчам, ортикча ишлов талаб килмайди. Техник холатда яшил-100 гр, биологик холатга оч кизил-120-150 гр огирликга эга. Мева деворининг калинлиги 5-8 мм. Биринчи мевалари учкир, кегин пирамида холатлатга утади. Стресс холатларига, (Va,Vd) ветицилиозга чидамли ва (TMV) тамаки мойкаси вирусига нисбий чидамли. Иссикхона ва очик далада етиштиришга мулжалланган.



F1 Бокеле (60)

Эртапишар, очик ва епик далада баҳор ва езд даврга мўлжалланган дурагай. Вегитатаив даври 80-85 кун, мева шакли думалок, тўк пушти ранг, 180-220 гр, палаги баққуват, мева етилиши бир хилда. Ишлаб чиқариш ва маҳаллий бозор учун мўлжалланган. Касалликга чидамийлиги томатной мозаикаси (ToMV), вертициллёз сўлиш (Va, Vd), фузариоз (Fol-2), томат бронза догланиш вирусига (TSWV) ва томат сарик догли барглар сулиши виусига (TYLCV). Хосилдорлиги 1 м2 ердан 8-10 кг очик далада ва 12-15 кг пленка остида.



УРУҒЛАР

F1 Катя®

Жуда эрта пишар дурагай. Пишиш даври 75-80 кун. Урта палакли, биринчи хосиллар 5-6 чи барг остида хосил булади. Меваси думалок, кизил, киприк остида яшил догларсиз, мева огирлиги 120-130 гр. Мева ерилиши, ToMV вирусига нисбий чидамли, альтернариоз (Asc) ва фитофтороз (Pi) га чидамли. Эрта пленка остига экиш учун мулжалланган.

F1 Тверия

Очик дала учун мулжалланган ўртапишар дурагай, вегетатив даври 110-120 кун, палаги кучли, иссиқга чидамли, стресс ҳолатларга чидамли, мева шакли думалок, 200-250 гр, тўқ қизил рангда. Ишлаб чиқариш ва маҳаллий бозор учун мулжалланган. Касалликга чидамийлиги томат бронза доғланиш вируси (TSWV), фузариоз сулиш (Fol 1-2), вертициллез сулиш (Va, Vd) ва бактериал доғланиш (Pst). Экиш схемаси 90x30 см. Қуруқ моддаси 5,8-6,2%, витамин С 18-21 мг%, шакар миқдори 3,8-4%, кислотаси 0,48%.

F1 Вериге

Эртапишар, очик ва епик дала учун мулжалланган, шода бўлиб етиладиган детерминант гибрид. Вегетатив даври 90-95 кун, Биринчи ҳосил 6 чи барг остида ҳосил булади. Мевалари думалок еки билинар билинмас овал шаклда, тўқ кизил рангли, икки камерали, мева огирлиги 20-25 гр, қаттиқ, хар бир шодада ўртача 8-10 мева ҳосил булади. Ишлаб чиқариш ва маҳаллий бозор учун мулжалланган. Касалликга чидамийлиги вертициллез сулиш (Va, Vd), фузариоз (Fol 1-2), томат бронза доғланиш вируси (TSWV). Экиш схемаси 70x40 см.



УРУҒЛАР



DKC 3623	ФАО 270
DKC 6664	ФАО 630
DKC 6777	ФАО 700
DKC 7240	ФАО 750

УРУҒЛАР

Дон ва силос

PELOTA

ФАО 550



Силос ва дон

MAS 73E

ФАО 700





ЭСЛАТМА!

Ушбу препаратлар Ўзбекистан Республикаси кимёлаштириш ва ўсимликларни химоя қилиш воситалари давлат комиссияси томонидан «Ўзбекистон Республикаси қшилоқ хўжалигида ишлатиш учун рухсат этилган пестицидлар ва агрохимикатлар рўйхати»га киритилган. Препаратдан фойдаланишда, белгиланган талаб ва меъёрларга риоя қилиш, ҳамда тегишли самара бериши юзасидан барча жавобгарликни «Истеъмомчи» зиммасига юклатилади.

Препаратни қўллашдан аввал йўриқномани диққат билан ўқиб чиқинг! Препарат ва минерал ўғитларни болалар қўли етмайдиган жойларда, озиқ овқат маҳсулотлари, қорамол озуқаларидан алоҳида сақлаш керак. Препаратни қўллаш вақтида (резина кўлқоп, кўзойнак ва махсус кийимбош) билан химояланиш, ишлов якунидан кейин юз-қўлни совунлаб ювиш талаб қилинади.

AgroVetHimoya

Корхона рахбари: (+99893) 501 93 50

Очик дала ва иссикхоналар бўйича агроном: (+99893) 501 93 01/02

Шоличилик бўйича агроном: (+99893) 501 93 19
(+99893) 501 93 32

Уруғчилик бўйича агроном: (+99893) 501 93 37

Тошкент шаҳридаги вакиллар: (+99893) 501 93 04
(+99893) 501 93 29

Вилоятлардаги вакилларнинг телефон ракамлари:

Тошкент: (+998 93) 501 93 40
(+998 93) 501 93 21

Наманган: (+998 93) 501 93 05
(+998 93) 501 93 31
(+998 93) 501 93 45

Бухоро: (+998 93) 501 93 08

Навоий: (+998 93) 501 93 10
(+998 93) 501 93 26

Самарканд: (+998 93) 501 93 23

Андижон: (+998 93) 501 93 25

Хоразм: (+998 93) 501 93 30

AgroVetHimoya



Манзил: 100050, Тошкент ш., Яшнобод т., Қорасув буйи кўч., 122Б ўй.
Тел/Факс: (+99871) 269 76 16
Моб: (+998 93) 501 93 00/01/02
E-mail: agrovethimoya@mail.ru
web: www.avh.uz